



(nirmatrelvir 150mg | ritonavir 100mg)

## DATOS IMPORTANTES

PAXLOVID (pax-LO-vid) (tabletas de nirmatrelvir; tabletas de ritonavir) coenvasado para uso oral

La información sobre riesgos que aquí se ofrece no es exhaustiva. Esta información no sustituye el hecho de hablar con su proveedor de atención médica sobre su enfermedad o tratamiento.

Para conocer más sobre PAXLOVID, hable con su profesional de atención médica o farmacéutico. Para obtener el etiquetado del producto aprobado por la FDA, llame al 1-800-438-1985 o visite [www.paxlovid.com](http://www.paxlovid.com).

### ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre PAXLOVID?

PAXLOVID puede interactuar con otros medicamentos causando efectos secundarios graves o potencialmente mortales, o incluso la muerte. Es importante conocer los medicamentos que no deben tomarse con PAXLOVID.

### No tome PAXLOVID si:

- está tomando alguno de los siguientes medicamentos:
  - alfuzosina
  - amiodarona
  - apalutamida
  - carbamazepina
  - colchicina
  - dihidroergotamina
  - dronedarona
  - eletriptán
  - enzalutamida
  - eplerenona
  - ergotamina
  - finerenona
  - flecainida
  - flibanserina
  - ivabradina
  - lomitapida
  - lovastatina
  - lumacaftor/ivacaftor
  - lurasidona
  - metilergonovina
  - midazolam (oral)
  - naloxegol
  - fenobarbital
  - fenitoína
  - pimozida
  - primidona
  - propafenona
  - quinidina
  - ranolazina
  - rifampicina
  - rifapentina
  - Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*)
  - sildenafil (Revatio®) para la hipertensión arterial pulmonar
  - silodosina
  - simvastatina
  - suzetrigina
  - tolvaptán
  - triazolam
  - ubrogepant
  - voclosporina

Estos no son los únicos medicamentos que pueden causar efectos secundarios graves o potencialmente mortales si se toman junto con PAXLOVID. PAXLOVID puede aumentar o disminuir los niveles de muchos otros medicamentos. Es muy importante que informe a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando porque pueden ser necesarios análisis de laboratorio adicionales o cambios en la dosis de sus otros medicamentos durante el tratamiento con PAXLOVID. Su médico también puede informarle sobre los síntomas específicos a los que debe estar atento y que pueden indicar que necesita suspender o disminuir la dosis de algunos de sus otros medicamentos.

- es alérgico al nirmatrelvir, al ritonavir o a cualquiera de los ingredientes de PAXLOVID. Consulte al final de este prospecto la lista completa de ingredientes de PAXLOVID. Consulte “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de PAXLOVID?” para conocer los signos y síntomas de las reacciones alérgicas.

### ¿Qué es PAXLOVID?

PAXLOVID es un medicamento de prescripción utilizado para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) de leve a moderada en adultos con alto riesgo de progresión a COVID-19 grave, incluyendo hospitalización o muerte.

PAXLOVID no está aprobado para su uso como tratamiento previo o posterior a la exposición para la prevención de la COVID-19.

### Antes de tomar PAXLOVID, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- tiene problemas renales. Usted puede necesitar una dosis o un programa de dosificación diferente de PAXLOVID.
- tiene problemas hepáticos, incluida hepatitis.
- tiene infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 1 (VIH-1). PAXLOVID puede hacer que algunos medicamentos para el VIH-1 no actúen con la misma eficacia en el futuro.
- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si PAXLOVID puede dañar a un bebé en gestación. Informe inmediatamente a su médico si está o queda embarazada.
- está amamantando o planea hacerlo. PAXLOVID puede pasar a la leche materna. Consulte a su profesional de la salud cuál es la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento con PAXLOVID.

### Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los de venta con y sin receta médica, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

- Su proveedor de atención médica puede decirle si es seguro tomar PAXLOVID con otros medicamentos.
- Puede pedir a su médico o farmacéutico una lista de los medicamentos que interactúan con PAXLOVID.
- No empiece a tomar un nuevo medicamento sin decírselo a su proveedor de atención médica.

### Informe a su proveedor de atención médica si está tomando anticonceptivos combinados (anticonceptivos hormonales).

PAXLOVID puede afectar el funcionamiento de sus anticonceptivos hormonales. Las mujeres que puedan quedar embarazadas deben utilizar otro método anticonceptivo alternativo eficaz o un método anticonceptivo de barrera adicional durante el tratamiento con PAXLOVID. Hable con su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta sobre los métodos anticonceptivos que podrían ser adecuados para usted.

### ¿Cómo debo tomar PAXLOVID?

- Tome PAXLOVID exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.
- **PAXLOVID está compuesto por 2 medicamentos: tabletas de nirmatrelvir y tabletas de ritonavir. Los 2 medicamentos se toman juntos durante 5 días.**
  - El nirmatrelvir es una tableta ovalada de color rosa.
  - El ritonavir es una tableta blanca o blanquecina.
- PAXLOVID está disponible en envases de 3 dosis. Su proveedor de atención médica le recetará el envase de dosis de PAXLOVID adecuado para usted. Siga las instrucciones del envase de dosis que reciba.
- **Si padece una enfermedad renal, es posible que su proveedor de atención médica le recete una dosis más baja. Hable con su proveedor de atención médica para asegurarse de que recibe el envase de dosis correcto.**

- No saque sus tabletas de PAXLOVID de la tarjeta blíster antes de estar listo para tomar su dosis.
- Si está tomando las tabletas de PAXLOVID dos veces al día, tome su primera dosis de PAXLOVID por la mañana o al acostarse, dependiendo de cuándo busque su receta, o como le indique su proveedor de atención médica. **Tome sus dosis aproximadamente a la misma hora cada día.**
- Si padece una enfermedad renal grave y está tomando tabletas de PAXLOVID **una vez al día**, siga las instrucciones sobre la dosis diaria que aparecen en la tarjeta blíster. **Tome su dosis aproximadamente a la misma hora cada día.**
- Trague las tabletas enteras. No mastique, rompa ni triture las tabletas.
- Tome PAXLOVID con o sin alimentos.
- No deje de tomar PAXLOVID sin hablar con su proveedor de atención médica, aunque se sienta mejor.
- Si olvida tomar una dosis de PAXLOVID dentro de las 8 horas siguientes a la hora habitual, tómela en cuanto se acuerde. Si olvida una dosis durante más de 8 horas, sátese la dosis olvidada y tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome 2 dosis de PAXLOVID al mismo tiempo.
- Si toma demasiado PAXLOVID, llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente al servicio de urgencias del hospital más cercano.
- Si está tomando un medicamento que contiene ritonavir o cobicistat para tratar la hepatitis C o la infección por VIH-1, debe seguir tomando su medicamento tal y como se lo haya recetado su proveedor de atención médica.

Hable con su proveedor de atención médica si no se siente mejor o si se siente peor después de 5 días.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de PAXLOVID?

**PAXLOVID puede provocar efectos secundarios graves, que incluyen los siguientes:**

- **Reacciones alérgicas, incluyendo reacciones alérgicas graves (anafilaxia)**, han ocurrido durante el tratamiento con PAXLOVID. Deje de tomar PAXLOVID y busque ayuda médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica:
  - erupción cutánea, urticaria, ampollas o descamación de la piel
  - llagas o úlceras dolorosas en la boca, la nariz, la garganta o la zona genital
  - hinchazón de la boca, los labios, la lengua o la cara
  - problemas para tragar o respirar
  - opresión en la garganta
  - ronquera

- **Problemas hepáticos.** Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si presenta alguno de los siguientes signos y síntomas de problemas hepáticos durante el tratamiento con PAXLOVID:
  - pérdida de apetito
  - coloración amarillenta de la piel y del blanco de los ojos
  - orina de color oscuro
  - heces de color pálido
  - picor en la piel
  - dolor en la zona del estómago (abdominal)

**Los efectos secundarios más comunes de PAXLOVID incluyen:** alteración del sentido del gusto (como sabor metálico, amargo) y diarrea.

Otros efectos secundarios posibles incluyen los siguientes:

- dolor de cabeza
- vómitos
- dolor abdominal
- náuseas
- presión arterial alta
- malestar general

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de PAXLOVID. Para más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

Llame a su médico para que le aconseje sobre los efectos secundarios. Puede informar de los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

### ¿Cómo debo guardar PAXLOVID?

- Guarde PAXLOVID a temperatura ambiente entre 20°C y 25°C (68°F y 77°F).

**Mantenga PAXLOVID y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.**

### Información general sobre el uso seguro y eficaz de PAXLOVID.

A veces se recetan medicamentos para fines distintos de los que figuran en el prospecto de información al paciente. No utilice PAXLOVID para una enfermedad para la que no ha sido recetado. No dé PAXLOVID a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Puede perjudicarlos. Puede pedir a su proveedor de atención médica o farmacéutico más información sobre PAXLOVID que ha sido escrita para profesionales de la salud.

### ¿Cuáles son los ingredientes de PAXLOVID?

**Ingrediente activo:** nirmatrelvir y ritonavir

**Ingredientes inactivos del nirmatrelvir:** dióxido de silicio coloidal, croscarmelosa sódica, lactosa monohidrato, celulosa microcristalina y estearil fumarato sódico. El recubrimiento de película contiene: hidroxipropilmetilcelulosa, óxido de hierro rojo, polietilenglicol y dióxido de titanio.

**Ingredientes inactivos del ritonavir:** fosfato cálcico dibásico anhidro, dióxido de silicio coloidal, copovidona, estearil fumarato de sodio y monolaurato de sorbitán. El recubrimiento de película puede contener: sílice coloidal anhidra, dióxido de silicio coloidal, hidroxipropilcelulosa, hipromelosa, polietilenglicol, polisorbato 80, talco y dióxido de titanio.



Distribuido por **Pfizer Labs**  
División de Pfizer Inc. Nueva York, NY 10001

LAB-1524-5.0  
Para obtener más información, visite [www.pfizer.com](http://www.pfizer.com) o llame al 1-800-438-1985.